

# NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 19/05/2024, 13:11. CREA/SNCV ©2011-2024.



## Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, U.O.S. Viticoltura di Grugliasco (TO); Azienda Sperimentale Regionale "Tenuta Cannona", Carpeneto (AL)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 127 del 04/06/2014

## Origine

Canale (CN)

I-CVT E6

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Ubicazione                     | Monteu Roero (CN)                    |
| Forma di allevamento           | Controspalliera con potatura a Guyot |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 4600                                 |
| Periodo di osservazione        | 2010-2012                            |

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità medio-alta
- ✓ Produttività buona, ma leggermente inferiore

| FASE FENOLOGICA | EPOCA                |
|-----------------|----------------------|
| Germogliamento  | I decade Aprile      |
| Fioritura       | I decade Giugno      |
| Invaiaura       | II decade Agosto     |
| Maturazione (*) | III decade Settembre |

## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo grande, piramidale, molto compatto, con ali corte
- ✿ Acino medio-piccolo, ellissoidale, corto, con buccia consistente e molto pruinosa, di colore blu-nero



(\*) Per il triennio considerato, si evidenzia un anticipo della maturazione rispetto alle tradizionali attitudini della cultivar (maturazione: tardiva, seconda decade di ottobre); ciò può essere messo in relazione alle temperature piuttosto elevate abbinate alla scarsità di precipitazione, che hanno caratterizzato il periodo tardo estivo.

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE****CRITTOGAMICHE (\*\*)**

|         |   |
|---------|---|
| Botrite | - |
| Oidio   | - |

**CARATTERISTICHE  
PRODUTTIVE CLONE**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fertilità reale               | 1,6   |
| Produzione per ceppo (Kg)     | 4,71  |
| Numero grappoli/ceppo         | 14    |
| Peso medio grappolo (g)       | 332   |
| Peso medio acino (g)          | 2,03  |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | 1.090 |
| Indice di Ravaz               | 4,32  |

**PARAMETRI  
ENOCHIMICI CLONE**

|       |                          |           |
|-------|--------------------------|-----------|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix)         | 23,25     |
|       | pH                       | 3,31      |
|       | Acidità totale (g/l)     | 5,63      |
|       | Ac. Tartarico (g/l)      | 5,09      |
|       | Ac. Malico (g/l)         | 1,77      |
| VINO  | Antociani totali (mg/l)  | 110 (***) |
|       | Polifenoli totali (mg/l) | -         |

**ANALISI SENSORIALE****DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore intenso, con riflessi tendenti al granato più che all'aranciato. Nel 2011, in particolare, il vino è stato apprezzato per i delicati profumi di frutti rossi e spezie, per l'equilibrio gustativo, la buona struttura e persistenza.

(\*\*) La risposta alle avversità di natura parassitaria da parte del clone, non si è rivelata diversa da quella propria della cultivar. Il Nebbiolo è sensibile all'oidio e, nelle annate predisponenti, alla muffa grigia del grappolo.

(\*\*\*) Dati medi relativi al biennio 2010-2011