

RIESLING RENANO B.

Documento aggiornato al: 19/05/2024, 10:44. CREA/SNCV ©2011-2024.



Costruttore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine
Ruda (UD)

I-ISV-F 1
TOPPANI

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Buttrio (UD); Spilimbergo (PN)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1986-1988

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Buona fertilità delle gemme basali
- ✓ Produttività inferiore

FASE	EPOCA
FENOLOGICA	
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✳ Grappolo piccolo, cilindrico, corto
- ✳ Acino piccolo, rotondeggiante; a maturazione tende ad assumere una colorazione giallo-dorata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità potenziale delle gemme	1,67
Produzione per ceppo (Kg)	4,7
Numero grappoli/ceppo	60,6
Peso medio grappolo (g)	77,6
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,75
	pH	3,18
	Acidità totale (g/l)	7,5
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; snello, asciutto, elegante ed acidulo; aroma molto intenso, complesso e caratteristico. Di ottima qualità.
Da utilizzare come clone complementare miglioratore per vini da invecchiamento.