

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Durasa

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Durasa N.

Codice: 076

Sinonimi ufficiali:

Data di ammissione: 22/02/1971, decreto pubblicato sulla G.U. 71 del 22/03/1971

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: Anna Schneider e Stefano Raimondi - [Omissis], 2010

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Erbaluce nero a Bollengo (TO), Bonarda nel Tortonese, Nera lunga in Val Borbera.

2.2. Descrizione Ampelografica

Germoglio

Apice: estremamente tomentoso, di colore bianco, appena sfumato di rosa.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): di colore verde biancastro con tomento orizzontale fortissimo e prive di peli verticali.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): verdi, sfumate di giallo oro, piane, cotonose inferiormente.

Tralcio erbaceo: rosso-violaceo sul lato dorsale; verde striato di rosso sul lato ventrale; estremità del giovane germoglio foggiate a pastorale.

Foglia adulta: da media a grande, da cuneiforme a pentagonale, trilobata o anche pentalobata, con i lobi laterali superiori terminanti con lunghi denti spesso divergenti; seno peziolare a V o talvolta ad U, poco aperto; seni laterali superiori ad U con fondo largo (tipo Uva rara o Barbera), generalmente aperti; simili gli inferiori, quando presenti; lembo verde piuttosto scuro, con bollosità medio-forte e piuttosto fine, profilo piano con frequenti ginocchiate sulle nervature principali e margini revoluti; punto peziolare e talora base delle nervature rosati o rossi; denti medio-lunghi a margini curiosamente concavi o concavo-convessi; pagina inferiore cotonosa e con media setolosità sulle nervature.

Picciolo: violaceo, setoloso.

Grappolo a maturità: medio o medio-grande, piramidale allungato, spesso con un'ala lungamente pedunculata o anche doppio, spargolo; peduncolo verde chiaro appena rosato, piuttosto lungo.

Acino: medio-grande, sferico; buccia di medio spessore, fortemente pruinosa, di colore blu-nero; l'uva ha sapore gradevole, benché non aromatico.

2.3. Fenologia

Germogliamento: media epoca o medio-precoc.

Fioritura: media epoca.

Invaitura: media epoca (fine della seconda decade di Agosto).

Maturazione dell'uva: medio-tardiva (contemporanea al Barbera).

2.4. Caratteristiche ed Attitudini culturali

Vigorìa: elevata, con internodi medi; germogli anticipati mediamente sviluppati; portamento da semi-eretto ad orizzontale.

Fertilità e produzione: fertilità medio-elevata, di poco inferiore a livello delle prime gemme basali. Produttività media o medio-elevata, rami anticipati non produttivi.

Allevamento e potatura: normalmente allevata a spalliera con potatura Guyot.

Suscettibilità ad avversità e fitopatie: generalmente poco suscettibile ad avversità e parassiti, la Durasa può essere per contro soggetta ad acinellatura dolce o a colatura dei grappoli.

Comportamento alla moltiplicazione: nessuna disaffinità manifestata.

2.5. Utilizzazione

Per la vinificazione.

3. COLTIVAZIONE

3.1 Classificazione

3.1.1. Idonea

In tutta la regione: Piemonte

4. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
-	167	80	24	6

5. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2013 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2021	80	-	-	-
2020	90	-	-	-

* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005