

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Grecanico Dorato

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Grecanico Dorato B.

Codice: 094

Sinonimi ufficiali: (092) Garganega B.

Data di ammissione: 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G. U. 149 del 17/06/1970

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: A. Mazzei ed A. Zappalà & Agrave; - "Grecanico dorato", in *Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume IV, 1965*

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Recanicu; "Grecanico bianco"; "Grecanio"; "Grecanicu biancu". Secondo Carpentieri, sarebbe identico al "Greco d Arcetri" o "Decanico", sinonimi da noi non riscontrati in Sicilia. Con Decreto del 30 Maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell 11/06/2018, è stata riconosciuta la sinonimia tra Grecanico dorato B. (094) e la Garganega B. (092).

2.2. Descrizione Ampelografica

Il vitigno è stato descritto utilizzando un clone di "Grecanico dorato", nella collezione ampelografica "F. Paulsen" dell Istituto Tecnico Agrario Statale di Marsala, sita a Marsala (Trapani), in contrada "Badia". I caratteri rilevati nella suddetta collezione sono stati, successivamente, confrontati con quelli del "Grecanico dorato" coltivato nei comuni di Marsala e Mazara del Vallo (Trapani), e con quelli presentati dai cloni della collezione ampelografica dell Istituto Tecnico Agrario Statale di Catania.

Germoglio di 10-20 cm

Apice: espanso, verde-biancastro con orlo carminato, cotonoso.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, bianco-verdastre, più o meno cotonose.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, verde-chiare con sfumature gialle ai margini, lanuginose.

Asse del germoglio: ricurvo.

Germoglio alla fioritura

Apice: espanso, biancastro con orli più o meno ramati, cotonoso.

Foglioline apicali: piegata a gronda la prima, piegate verso la pagina inferiore le rimanenti; verde-biancastre le prime due foglioline, verde-bronzata che sfuma verso il color carminio la terza; cotonose le prime due foglioline, lanuginosa la terza.

Foglioline basali: spiegate; bronzata la prima, verde-chiare le rimanenti; più o meno lanuginose.

Asse del germoglio: ricurvo.

Tralcio erbaceo: colore verde, diffuso interamente; sezione trasversale circolare; contorno angoloso; aracnoideo.

Vitici: bifidi e trifidi, lunghi, sottili; verde-bronzati; a distribuzione irregolare.

Infiorescenza: media, piramidale.

Fiore: bottone florale globoso, piccolo; sessualità apparente: ermafrodita.

Foglia: media, pentagonale, quinquelobata, con lobi inferiori meno marcati di quelli superiori; seno peziolare ad U largo; seni laterali superiori chiusi, con bordi sovrapposti o quasi; qualche volta a lira aperta od a V; seni laterali inferiori a V stretta, con bordi paralleli, meno marcati di quelli superiori; lobi piani; angolo alla sommità dei lobi terminali lievemente ottuso; pagina superiore colore verde-chiaro, superficie del lembo rugosa, sottile, opaca, poco aracnoidea, con le nervature principali lanuginose; pagina inferiore colore verde-pallido, lanuginosa, con le nervature di I e II ordine quasi cotonose; nervature parzialmente rosse, superiormente ed inferiormente; nervature di I, II e III ordine sporgenti; denti irregolari molto pronunciati; a margini concavi, oppure concavi da un lato e convessi dall altro; a base larga.

Picciolo: medio, di grossezza media, aracnoideo; sezione trasversale con canale poco evidente.

Colorazione autunnale delle foglie: verde-giallastra.

Grappolo a maturità industriale: medio; lungo, in media, cm 22; allungato, cilindrico, alato (con una o due ali), mediamente spargolo, qualche volta acinellato; peduncolo non visibile (corto), erbaceo, grosso, grigio-chiaro; pedicello piuttosto lungo, grigio-chiaro; cercine evidente, grigio-chiaro, con verruche grigio-scure; pennello medio, giallo-paglierino; separazione del pedicello dall acino: facile.

Acino: medio, sferoide-ellissoide, di forma regolare, con sezione trasversale regolare (circolare); buccia di colore giallo-dorato, regolarmente distribuito, poco pruinosa, spessa e consistente; ombelico persistente e prominente; polpa succosa, di sapore semplice e dolce; succo incolore.

Vinaccioli: numero medio, 1 per acino; qualche volta, 2.

Tralcio legnoso: lunghezza media (circa m 1,80), debole, elastico, poco ramificato; con corteccia resistente; sezione trasversale ellittica; superficie parzialmente pruinosa; pruinosa in vicinanza dei nodi, glabra, striata; nodi non evidenti; meristalli corti, di 6-7 cm, di color nocciola scuro non uniforme, più intenso ai nodi, dove vira, spesso, verso il violaceo; gemme appuntite, molto sporgenti; cercine peziolare medio, poco sporgente, rettilineo perpendicolare; diaframma piano-convesso.

Tronco: medio.

2.3. Fenologia

Condizioni di osservazione: si considerano quelle della collezione ampelografica dell'Istituto Tecnico Agrario Statale di Marsala, sito a Marsala (prov. di Trapani), contrada "Badia".

Ubicazione

Longitudine: 12°27(primi)26" E (Greenwich).

Latitudine: 37°47(primi)46" N.

Altitudine: m 7, circa, s.l.m.

Esposizione: Nord-Ovest.

Portinnesto: "Berlandieri x Rupestris 17/37".

Età delle viti: anni 6.

Sistema di allevamento: a piccola espansione (alberello marsalese).

Terreno: piano, calcareo-argilloso.

Fenomeni vegetativi

Germogliamento: tardivo; fra la prima e la seconda decade di Aprile.

Fioritura : tardiva; tra la fine di Maggio ed i primi di Giugno.

Maturazione dell'uva: III epoca; fra la prima e la seconda decade di Settembre.

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

Vigoria: ottima; forma di allevamento a piccola espansione (alberello basso marsalese); potatura corta (talora una branca dell'alberello viene potata alla Guyot).

Produzione: abbondante (in media, 60-100 q.li ad ha) e costante.

Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.

Numero medio di infiorescenze per germoglio: uno.

Fertilità delle femminelle: saltuaria.

Resistenza alle avversità meteoriche, malattie e parassiti: buona, particolarmente resistente alla siccità e agra;

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: buono, specialmente sui seguenti portinnesti: "Berlandieri x Riparia 420A"; "Berlandieri x Rupestris 17/37"; "Berlandieri R.N.2 x (Aramon x Rupestris Ganzin N.1) 1045 P"; "Berlandieri x Rupestris 779 P".

2.5. Utilizzazione

Esclusivamente per la vinificazione.

3. COLTIVAZIONE

3.1 Classificazione

3.1.1. Idonea

In tutta la regione: Sicilia

3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

3.2.1. DOC

Alcamo, Contessa Entellina, Delia Nivolelli, Erice, Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Sicilia

3.2.1. IGT

Avola, Camarro, Salemi*, Salina*, Terre Siciliane*, Valle Belice*

* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO

| Codice | Nome | Data emanazione | Codice proponente | G.U. | del |
|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| 001 | I - VCR 13 | 2002-11-27 | 2 | G. U. 19 | 2003-01-24 |
| 002 | I - Regione Sicilia 94 | 2011-04-22 | 84 | G. U. 170 | 2011-07-23 |

Legenda codici proponenti

2) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

84) - Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari

5. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

| 1970 | 1982 | 1990 | 2000 | 2010 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.169 | 2.898 | 4.545 | 5.172 | 4.083 |

6. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2013 all'ultimo dato disponibile.

| Anno | Standard | Certificato | Base | Iniziale * |
|------|----------|-------------|-------|------------|
| 2022 | 130.785 | 59.879 | - | 192 |
| 2021 | 149.538 | 96.967 | 26 | 955 |
| 2020 | 173.691 | 70.192 | 3.230 | - |
| 2019 | 123.339 | 79.642 | 2.989 | - |
| 2018 | 100.224 | 68.415 | 3.160 | - |
| 2017 | 120.381 | 56.515 | 3.675 | - |
| 2016 | 88.844 | 40.700 | 4.039 | - |
| 2015 | 311.116 | - | 3.515 | - |
| 2014 | 251.482 | 22.590 | 682 | - |
| 2013 | 223.295 | 11.245 | - | - |

* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005