Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Cabernet Blanc

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Cabernet Blanc B.

Codice: 916

Sinonimi ufficiali:

Data di ammissione: 9/06/2020, decreto pubblicato sulla G.U. 152 del 17/06/2020

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Estratto dalla domanda di iscrizione della variet? al Registro Nazionale, presso il MIPAAF, 2020

2.1. Descrizione

Il vitigno Cabernet Sauvignon e altri parentali resistenti alle crittogame fungine, sono i genitori genetici di questa varietà selezionata nel 1991 dallo svizzero Valentin Blattner. Il vivaista tedesco Volker Freytag si è occupato per diversi anni di analisi sperimentali. Grazie a questo suo sforzo, il vitigno è stato inserito nel catalogo ufficiale delle varietà della Repubblica Federale di Germania. Oltre che in Germania, questa varietà di sta diffondendo anche nel Regno Unito, nel Benelux e in Francia con molti ettari piantati.

Questa varietà è nata con l obbiettivo di trovare un esemplare genetico tollerante alle crittogame fungine, che maturasse prima e più omogeneamente e con un profilo particolarmente aromatico.

Le osservazioni sono state fatte presso il BUNDESSORTENAMT, Stazione di Mußbach, Germania e le caratteristiche descrittive riportate seguono la scheda UPOV.

La varietà è diversa dalla varietà similare Johanniter per i seguenti caratteri:

OIV 204 - Compattezza del grappolo - 2)molto spargolo spargolo per Cabernet blanc e 6) medio compatto per Johanniter;

OIV 004 - Densità peli striscianti dell apice - 5) media per Cabernet blanc 7) elevata per Johanniter.

Germoglio (osservazioni su germogli di 10-30 cm.)

001 - Apertura dell apice (30-60 cm) - 5) completa mente aperto

002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell apice - 4) debole media

004 - Densità peli striscianti dell apice - 5) media

006 - Portamento (prima della legatura) - 2) eretto - semieretto

007 - Colore del lato dorsale degli internodi - 1) ver de

008 - Colore del lato ventrale degli internodi - 1) v erde

Cirri

016 - Numero viticci consecutivi - 1) 2 o meno

Foglia giovane (le prime sei foglie dell?apice, alla fioritura)

051 - Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4° foglia) - 2) giallo

053 - Foglia giovane: densità dei peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore del lembo (4° foglia) - 4) da scarso a medio

Foglia adulta

065 - Dimensione del lembo - 5) medio

067 - Forma del lembo - 3) pentagonale

068 - Numero di lobi - 3) cinque

070 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo - 3) fino alla 1a biforcazione

074 - Profilo del lembo in sezione trasversale - 5) contorto

075 - Bollosità della pagina superiore del lembo - 5) media

076 - Forma dei denti - 3) entrambi i lati convessi

078 - Lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza - 4) da corto a medio

079 - Grado di apertura/sovrapposizione del seno peziolare. - 3) aperto

081-2 - Base del seno peziolare delimitata dalle nervature - 1) non delimitata

084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo - 4) da scarso a medio

094 - Profondità dei seni laterali superiori - 6) med i e profondi

Infiorescenza

documento generato il 18-10-2025, 02:52

151 - Organi sessuali - 3) stami e gineceo completamente sviluppati

Grappolo

202 - Lunghezza (escluso il peduncolo) - 5) medio circa 160 mm.

203 - Larghezza - 5) medio circa 120 mm.

204 - Compattezza - 2) da molto spargolo a spargolo

206 - Lunghezza del peduncolo del grappolo principale - 5) medio circa 70 mm.

Acino

220 - Lunghezza - 4) da piccolo a medio

221 - Larghezza - 4) da piccolo a medio

223 - Forma - 4) ellissoidale stretto

225 - Colore della buccia - 1) verde giallo

228 - Spessore della buccia - 5) media

231 - Intensità pigmentazione antocianica della polpa - 1) nulla o molto debole

235 - Consistenza della polpa - 2) leggermente soda

236 - Sapore particolare - 5) aroma diverso da moscato, foxy o erbaceo

241 - Sviluppo dei vinaccioli - 3) completo

2.2. Fenologia

301 - Epoca di germogliamento - 4) medio precoce

303 - Epoca di invaiatura - 7) tardiva

2.3. Utilizzazione

Per vinificazione

3. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2015 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2023	-	4.700	-	-
2022	600	4.500	-	-
2020	27.050	-	-	-

** : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005*