

CILIEGIOLO N.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 136 del 24/05/1976

Origine

Dozza (BO)

I-CL CAB 8

CAMPO DI OMOLGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Tebano (BO)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Capovolto
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1970-1975

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoroso, rustico
- ✓ Fertilità media, buona nelle gemme basali
- ✓ Produttività abbondante

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio, conico, compatto; peduncolo lungo, grosso e semilegoso
- ▣ Acino grosso, di forma tronco-ovoide, con buccia spessa, coriacea, di colore blu-nerastro, pruinosa; vinaccioli con becco grosso

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE***CLONE******CRITTOGAMICHE***

Botrite	Medio-alta
Oidio	Media

CARATTERISTICHE***CLONE******PRODUTTIVE***

Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI***CLONE******ENOCHIMICI***

MOSTO	Zuccheri (° Brix)	21,2
	pH	3,12
	Acidità totale (g/l)	5,25
	Ac. Tartarico (g/l)	5,90
	Ac. Malico (g/l)	2,06
	Antociani totali (mg/l)	-
VINO	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

Clone idoneo per novelli e vini d'annata; utilizzato in uvaggio con Sangiovese, cui aggiunge profumi.