# CILIEGIOLO N.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 04:15. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 136 del 24/05/1976

Origine Dozza (BO)

### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Tebano (BO)

Forma di allevamento Controspalliera potata a Capovolto

Densità di impianto (ceppi/ha) 
Periodo di osservazione 1970-1975


#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoroso, rustico
- ✓ Fertilità media, buona nelle gemme basali
- ✓ Produttività abbondante

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, conico, compatto; peduncolo lungo, grosso e semilegnoso
- Acino grosso, di forma tronco-ovoide, con buccia spessa, coriacea, di colore bluenerastro, pruinosa; vinaccioli con becco grosso



Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE	
Botrite	Medio-alta
Oidio	Media

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	21,2
9	рН	3,12
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,25
M	Ac. Tartarico (g/l)	5,90
	Ac. Malico (g/l)	2,06
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VI	Polifenoli totali (mg/l)	-

## ANALISI SENSORIALE

## **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Clone idoneo per novelli e vini d'annata; utilizzato in uvaggio con Sangiovese, cui aggiunge profumi.

