CORVINA N.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 03:50. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite $G.U.\ n.\ 300\ del\ 31/10/1980$

Origine

Affi (VR)

-ISV-CV 7

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione S. Giorgio in Salici (VR); S. Pietro in Cariano (VR)

Forma di allevamento

-

Densità di impianto (ceppi/ha)

2100

Periodo di osservazione

1976-1978

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Buon equilibrio vegeto-produttivo

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	

Botrite	13,2
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo grande, caratteristico, alato, a volte compatto
- Macino medio-grosso, ellissoidale



CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,21
Produzione per ceppo (Kg)	14,6
Numero grappoli/ceppo	59
Peso medio grappolo (g)	246,7
Peso medio acino (g)	1,89
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	17,04
<u> </u>	рН	3,19
MOSTO	Acidità totale (g/l)	9,6
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
I	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; profumo delicato; di buona acidità, vivace, piacevole, armonico. Adatto anche per la produzione di vini leggeri di corpo.

