

CORVINA N.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:22. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti
Ortoflorovivaistici Veronesi;
Provincia di Verona – Servizio Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Località Quar, Pedemontane (VR)

I - Q4 Vitiver

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo più spargolo
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività buona e costante

FASE EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- ❖ Grappolo medio, spargolo,
- ❖ Acino piccolo



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE		CLONE
Fertilità reale	1,34	
Produzione per ceppo (Kg)	5,28	
Numero grappoli/ceppo	20,4	
Peso medio grappolo (g)	258,63	
Peso medio acino (g)	2,08	
Peso legno potatura (g/ceppo)	490	
Indice di Ravaz	10,77	

PARAMETRI ENOCHIMICI		CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	20,75
	pH	3,25
	Acidità totale (g/l)	6,38
	Ac. Tartarico (g/l)	5,46
VINO	Ac. Malico (g/l)	1,56
	Antociani totali (mg/l)	70 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.170,5 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino caratterizzato da un buon contenuto in polifenoli ed antociani, che conferiscono maggior colore e struttura. Elevata risulta anche l'intensità aromatico legata soprattutto alle note fruttate e speziate. Queste caratteristiche ne fanno un clone particolarmente indicato per la produzione di vini strutturati da invecchiamento. La maggior spargolicità del grappolo lo rende più idoneo all'appassimento per la produzione dei vini pregiati Veronesi.

(*) Dati medi relativi al biennio 2009-2010