GAMAY N.

Documento aggiornato al: 25/11/2026, 13:08. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Institut Agricole Regional

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 210 del 09/09/2005

Origine
Valle d'Aosta

I-IAR 4

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Moncenis (AO)	La Rochère (AO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot semplice	
Densità di impianto (ceppi/ha)	10.200	
Periodo di osservazione	1988-1991	1990-1993

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di dimensioni ridotte
- ✓ Vigoria superiore
- ✓ Produttività inferiore
- ✓ Accumulo zuccherino nelle bacche nettamente superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
Botrite	Media
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo
- Acino

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)	CLONE (**)
Fertilità reale	-	-
Produzione per ceppo (Kg)	2,10	2,56
Numero grappoli/ceppo	14,2	21
Peso medio grappolo (g)	148,6	121,5
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	580	670
Indice di Ravaz	3,62	3,82

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (*)	CLONE (**)
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	23,27	22,88
	pH	3,18	3,20
	Acidità totale (g/l)	8,32	8,17
	Ac. Tartarico (g/l)	7,17	7,58
	Ac. Malico (g/l)	3,57	3,14
VINO	Antociani totali (mg/l)	-	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

(*) Località Moncenis: il campo è situato ad un'altitudine di 750 m. s.l.m., su di un terreno ad esposizione sud-est, a pendenza media, di origine e composizione varia.
(**) Località La Rochère: il campo è situato ai piedi della collina di Aosta, ad un'altitudine di 600 m. s.l.m., su di un terreno con esposizione sud, a leggera pendenza, di prevalente origine morenica, ricco di scheletro.