

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:52. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Institut Agricole Regional

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 210 del 09/09/2005

Origine

Valle d'Aosta

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| Ubicazione | Moncenis (AO) | La Rochère (AO) | |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Guyot semplice | | |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 10.200 | | |
| Periodo di osservazione | 1988-1991 | 1990-1993 | |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di dimensioni ridotte
- ✓ Vigoria superiore
- ✓ Produttività inferiore
- ✓ Accumulo zuccherino nelle bacche nettamente superiore

| FASE FENOLOGICA | EPOCA |
|-----------------|--------------|
| Germogliamento | - |
| Fioritura | - |
| Invaiatura | - |
| Maturazione | - |
| 1,10001001010 | |

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

| Botrite | Media |
|---------|-------|
| Oidio | - |

IL GRAPPOLO

- Grappolo
- Acino



| CARATTERISTICHE | CLONE (*) | CLONE (**) |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| PRODUTTIVE | | |
| Fertilità reale | - | - |
| Produzione per ceppo (Kg) | 2,10 | 2,56 |
| Numero grappoli/ceppo | 14,2 | 21 |
| Peso medio grappolo (g) | 148,6 | 121,5 |
| Peso medio acino (g) | - | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | 580 | 670 |
| Indice di Ravaz | 3,62 | 3,82 |

| | Parametri enochimici | CLONE (*) | CLONE (**) |
|-------|--------------------------|-----------|------------|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | 23,27 | 22,88 |
| | рН | 3,18 | 3,20 |
| | Acidità totale (g/l) | 8,32 | 8,17 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | 7,17 | 7,58 |
| | Ac. Malico (g/l) | 3,57 | 3,14 |
| VINO | Antociani totali (mg/l) | - | - |
| | Polifenoli totali (mg/l) | - | - |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

^(**) Località La Rochère: il campo è situato ai piedi della collina di Aosta, ad un'altitudine di 600 m. s.l.m., su di un terreno con esposizione sud, a leggera pendenza, di prevalente origine morenica, ricco di scheletro.



^(*) Località Moncenis: il campo è situato ad un'altitudine di 750 m. s.l.m., su di un terreno ad esposizione sudest, a pendenza media, di origine e composizione varia.