# LAGREIN N.

*Documento aggiornato al: 22/12/2025, 20:24. CREA/SNCV ©2011-2025.*

I-SMA 66

**Costitutore**
Istituto Agrario di San Michele all'Adige – Fondazione Edmund Mach. Responsabile selezione: U. Malossini

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**
G.U. n. 323 del 18/11/1978

**Origine**
Mezzocorona (TN)

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|---|---|
| Ubicazione | Mezzocorona, pede-collina (215 m s.l.m.) |
| Forma di allevamento | Pergola trentina semplice |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 3.000 |
| Periodo di osservazione | 1998 - 2000 |

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio-inferiore
- ✓ Molto vigoroso
- ✓ Clone a rachide corto
- ✓ Fertilità inferiore
- ✓ Produttività inferiore



| FASE FENOLOGICA | EPOCA |
|---|---|
| Germogliamento | Medio |
| Fioritura | Media |
| Invaiatura | Media |
| Maturazione | Media |

## IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, alato, mediamente compatto
- Acino medio-grande, sub-ellittico

| SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE | CLONE |
|---|---|
| Botrite | Media |
| Oidio | Media |

| CARATTERISTICHE PRODUTTIVE | CLONE |
|---|---|
| Fertilità reale | 1,13 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 3,98 |
| Numero grappoli/ceppo | 16 |
| Peso medio grappolo (g) | 235,00 |
| Peso medio acino (g) | 2,24 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | 1.125 |
| Indice di Ravaz | 3,30 |

| | PARAMETRI ENOCHIMICI | CLONE |
|---|---|---|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | 19,45 |
| | pH | 3,29 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,65 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | 5,05 |
| | Ac. Malico (g/l) | 3,20 |
| VINO | Antociani totali (mg/l) | 6,80 |
| | Polifenoli totali (mg/l) | 1.472 |

## ANALISI SENSORIALE



## *DESCRIZIONE ORGANOLETTICA*

Vino di colore rubino intenso; si presenta con un ottima intensità colorante; all'olfatto risulta particolarmente complesso, con sentori di frutti di bosco. Al gusto è sapido, alcolico, ottimamente strutturato. Adatto all'invecchiamento per produzioni di qualità.

## *ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE*

La coltivazione del clone è indicata più in collina che in piano.