

LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 31/05/2026, 18:26. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 334 del 04/12/1981

Origine

Bolzano (BZ)

I-Lb 509

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Bolzano (BZ); Gries (BZ)
Forma di allevamento	Pergola semplice
Densità di impianto (ceppi/ha)	3500
Periodo di osservazione	1960-1977

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso inferiore
- ✓ Clone a rachide corto
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività moderata

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media



IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo piccolo, corto, piramidale, alato, semicompatto
- ✚ Acino medio-grosso, sub-ellittico

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	Media


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,34
Produzione per ceppo (Kg)	4,56
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	288,00
Peso medio acino (g)	2,05
Peso legno potatura (g/ceppo)	723
Indice di Ravaz	6,31

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,9
	pH	3,55
	Acidità totale (g/l)	6,7
	Ac. Tartarico (g/l)	6,4
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	2.329

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso, tendente al granato scuro; con profumo di viole, sapore intenso, persistente, con tannini morbidi, vellutati, di buona struttura. Adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perché si affini.