LAGREIN N.

Documento aggiornato al: 17/11/2026, 01:49. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg - Ora (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine
Bolzano (BZ)

I-Lb 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caldaro (BZ)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto	5555
Periodo di osservazione	2003-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓**Grappolo** a rachide lungo

✓ Vigoria media

✓ Fertilità media

✓ Produzione medio-alta e costante



FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO


- Grappolo medio, piramidale, alato, semicompatto
- Acino medio, sub-ellittico

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	CLONE
Botrite	Media
Oidio	Media

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	2,18
Numero grappoli/ceppo	9
Peso medio grappolo (g)	263,71
Peso medio acino (g)	2,09
Peso legno potatura (g/ceppo)	347,3
Indice di Ravaz	3,94

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,26
	pH	3,45
	Acidità totale (g/l)	7,02
	Ac. Tartarico (g/l)	6,7
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	2.684,75

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore intenso da rosso ciliegia profondo a rosso granato con netti riflessi violacei da vino giovane; profumo complesso, fruttato e tipico; acidità vivace, di buon corpo e persistenza, con tannini accentuati, leggermente amarognolo sul finale.
Clone adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2-3 anni) perchè si affini.