# LAMBRUSCO SALAMINO N.

*Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:15. CREA/SNCV ©2011-2025.*

**Costitutore**
Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**
G.U. n. 242 del 15/10/1991

**Origine**
Soliera (MO)

**I-CAB 3**

## *Campo di omologazione e confronto*

| | |
|---|---|
| Ubicazione | Loc. San Vito, Spilamberto (MO); San Matteo (MO) |
| Forma di allevamento | G.D.C. |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 1667 |
| Periodo di osservazione | 1982-1987 |

## *Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione*

- ✓ Vigoria medio-alta
- ✓ Produttività leggermente superiore

| *Fase fenologica* | *Epoca* |
|---|---|
| Germogliamento | I decade Aprile |
| Fioritura | I decade Giugno |
| Invaiatura | II decade Agosto |
| Maturazione | III decade Settembre |

## *Il Grappolo*

- Grappolo piccolo, cilindro-conico, talvolta con un'ala, compatto
- Acino piccolo, sferoide, con buccia non molto spessa, consistente, pruinosa, di colore blu-nero

| *SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE* | *CLONE* |
|---|---|
| Botrite | Bassa |
| Oidio | Bassa |

| *CARATTERISTICHE PRODUTTIVE* | *CLONE* |
|---|---|
| Fertilità reale | - |
| Produzione per ceppo (Kg) | 5,9 |
| Numero grappoli/ceppo | 38 |
| Peso medio grappolo (g) | 155 |
| Peso medio acino (g) | 1,06 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | *PARAMETRI ENOCHIMICI* | *CLONE* |
|---|---|---|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | 18,7 |
| | pH | 3,07 |
| | Acidità totale (g/l) | 10,61 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |
| VINO | Antociani totali (mg/l) | - |
| | Polifenoli totali (mg/l) | - |

## *ANALISI SENSORIALE*

## *DESCRIZIONE ORGANOLETTICA*

Vino con buona colorazione rosso rubino. Il clone viene utilizzato per ottenere vini frizzanti, spesso amabili.