

MALVASSIA ISTRIANA B.

Documento aggiornato al: 26/01/2026, 09:17. CREA/SNCV ©2011-2026.



CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine
Ruda (UD)

I-SV-F 6

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN); Buttrio (UD); Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1800
Periodo di osservazione	1983-1987

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo più grande e più spargolo
- ✓ Buona vigoria e produttività
- ✓ Contenuto zuccherino delle uve superiore


FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo cilindrico, lungo, talvolta alato
- Acino grosso, rotondeggiante, con buccia di colore dorato se esposto al sole



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE**

Botrite	Bassa
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE**PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,49
Produzione per ceppo (Kg)	7,1
Numero grappoli/ceppo	58,6
Peso medio grappolo (g)	121,1
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE**ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,21
	pH	3,25
	Acidità totale (g/l)	6,0
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo talvolta carico; tipico, leggermente alcolico, glicerinato, morbido; profumo ampio, leggermente aromatico che ricorda l'albicocca.