Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:03. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Azzano X (PN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monastier (TV); Spresiano (TV); Spilimbergo (PN); Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** leggermente più piccolo
- ✓ Buon equilibrio fisiologico-produttivo e vegetativo
- ✓ Fertilità superiore

FASE FENOLOGICA	E POCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, piramidale, mediamente compatto
- Macino piccolo, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,79
Produzione per ceppo (Kg)	10,2
Numero grappoli/ceppo	72,7
Peso medio grappolo (g)	140,3
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	19,21
2	рН	3,20
MOSTO	Acidità totale (g/l)	8,1
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino molto intenso; aroma caratteristico e delicato, con note speziate; sapore vinoso, di corposità media ed equilibrata; di buona alcolicità e acidità.

Per le sue caratteristiche peculiari è indicato come clone da taglio, sia per aumentare l'intensità colorante e l'acidità sia per arricchire il corredo aromatico.

