MERLOT N.

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:05. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Ruda (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Monastier (TV); Spresiano (TV); Spilimbergo (PN);

Codroipo (UD)

Forma di allevamento

-

Densità di impianto (ceppi/ha)

1700

Periodo di osservazione

1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività ottima

FASE	EPOCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	III decade Settembre	

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-grande, conico, mediamente compatto
- Acino medio, rotondeggiante





SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,67
Produzione per ceppo (Kg)	10,8
Numero grappoli/ceppo	70,3
Peso medio grappolo (g)	153,7
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	18,84
2	рН	3,22
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,9
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
ONL	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino vivace intenso; aroma fruttato, non intenso; sapore erbaceo, piacevole, robusto di corpo, di buona gradazione alcolica e giusta acidità, armonico. Indicato per produrre vini giovani.

