

MERLOT N.

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 04:06. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
Veneto Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 210 del 09/09/2005

Origine

Oderzo (TV)

I-ISV sn - V 14

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rua di Feletto (TV); Ogliano (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Sylvoz e a Cordone speronato
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1994-2002

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio
- ▣ Acino -

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,04
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	210
Peso medio acino (g)	1,99
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,2
	pH	3,22
	Acidità totale (g/l)	6,0
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	260
	Polifenoli totali (mg/l)	1.683

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino di buona intensità, con riflessi violacei; il profumo è predominante di fruttato, floreale e speziato; leggera la sensazione di erbaceo. Vino di buon corpo, elegante, armonico. Adatto al medio invecchiamento.