

# MERLOT N.

Documento aggiornato al: 25/05/2026, 15:34. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

CRA - Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano;  
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del  
Friuli Venezia Giulia

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 23/07/2011

## Origine

Corno di Rosazzo (UD)

I-CRAVIT-ERSA  
FVG 356

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	ERSAGRICOLA Az. "Pantianicco" (UD)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico bilaterale
Densità di impianto (ceppi/ha)	2750
Periodo di osservazione	2006-2008

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo** di dimensione inferiore (\*) e con marcata colorazione antocianica sia del peduncolo che degli acini

✓ Produttività leggermente inferiore

### FASE FENOLOGICA

### EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, semispargolo, piramidale, con piccola ala
- ✿ Acino medio, sferico, leggermente schiacciato, con colorazione violacea intensa



(\*) Rispetto al clone di riferimento *ERSA FVG 353*


**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE  
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>	<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,29
Produzione per ceppo (Kg)	4,34
Numero grappoli/ceppo	17,1
Peso medio grappolo (g)	256
Peso medio acino (g)	1,75
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.220
Indice di Ravaz	3,56

	<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>	<b>CLONE</b>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (°Brix)	21,82
	pH	3,57
	Acidità totale (g/l)	5,05
	Ac. Tartarico (g/l)	5,32
	Ac. Malico (g/l)	2,44
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/l)	619
	Polifenoli totali (mg/l)	1.824

**ANALISI SENSORIALE**



---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Vino dotato di una notevole intensità colorante e con un corredo aromatico intenso e complesso in cui prevalgono decisamente le note di confettura abbinata a ben distinte sensazioni di frutti rossi (mora e lampone), di floreale (violetta), di tabacco e di erbaceo fresco. Presenta buona struttura e persistenza unite ad un'ottima gradevolezza complessiva. Date le sue caratteristiche se ne consiglia l'utilizzo in miscela con altri cloni al fine di migliorare la tonalità colorante e complessare il corredo aromatico.