

MOLINARA N.

Documento aggiornato al: 08/01/2026, 13:42. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 24/07/2001

Origine

Illasi (VR)

I-VCR 12

CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO


Ubicazione	Rauscedo (PN); Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1997-1999

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria non troppo elevata
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Ottima resistenza alla botrite, anche nell'appassimento

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo medio, cilindro-piramidale, semicompatto
- ▣ Acino meno che medio, con buccia consistente di colore uniformemente distribuito ed abbastanza intenso



Rauscedo

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Inviaitura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,30
Produzione per ceppo (Kg)	7,41
Numero grappoli/ceppo	32,5
Peso medio grappolo (g)	228
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,67
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	8,53
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

Piavon di Oderzo

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Inviaitura	II-III decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,30
Produzione per ceppo (Kg)	7,44
Numero grappoli/ceppo	32,4
Peso medio grappolo (g)	229,7
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,87
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	8,83
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone si caratterizza per una maggiore pigmentazione antocianica e fornisce un vino di colore cerasuolo carico, con leggero e delicato profumo. Adatto all'uvaggio per la produzione di vini da consumarsi giovani.

La consistenza della buccia consente un ottimo appassimento in fruttaio.