## MOSCATO BIANCO B.

Documento aggiornato al: 04/12/2025, 15:09. CREA/SNCV ©2011-2025.



COSTILITORE

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 61 del 14/03/2006

### Origine

Calosso (AT)

#### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Calosso (AT)

Forma di allevamento Controspalliera potata a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 4000

Periodo di osservazione 1998-2003

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- √ Vigoria moderata
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività medio-elevata

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	Medio-precoce
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Medio-precoce

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, conico o piramidale, corto, moderatamente compatto, spesso con una o due ali corte
- Acino medio, sferoidale; buccia di colore giallo-verde, dorato se esposta al sole





# Suscettibilità malattie Clone crittogamiche

Botrite	Moderata
Oidio	Media

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,60
Produzione per ceppo (Kg)	3,20
Numero grappoli/ceppo	18
Peso medio grappolo (g)	190
Peso medio acino (g)	2,38
Peso legno potatura (g/ceppo)	530
Indice di Ravaz	6,03

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	20,1
9	pН	3,20
MOST	Acidità totale (g/l)	6,30
M	Ac. Tartarico (g/l)	4,50
	Ac. Malico (g/l)	2,20

#### ANALISI SENSORIALE

#### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Una concentrazione zuccherina elevata, l'acidità moderata ed un'ottima dotazione terpenica complessiva (550 e 900  $\mu$ /L rispettivamente di terpeni liberi e glucosidici) consentono l'ottenimento di un vino ben strutturato, di elevata aromaticità e discreta freschezza. Idoneo alla produzione di vini a 'tappo raso'.

