

MULLER THURGAU B.

Documento aggiornato al: 07/05/2026, 20:32. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 72 del 27/03/1995

Origine

Ossenigo (VR)


I-VCR 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1991-1993

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produttività buona e costante
- ✓ Acinellatura quasi assente



IL GRAPPOLO

- ✘ Grappolo medio, semispargolo, cilindrico
- ✘ Acino medio, ellissoide, uniforme, con buccia consistente

Rauscedo

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

<i>SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
-------------------------------------------------------------	---------------------

Botrite (*)	3,94
Oidio	-

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
----------------------------------------------	---------------------

Fertilità reale	1,70
Produzione per ceppo (Kg)	11,53
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	226,5
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
----------------------------------------	---------------------

MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,8
	pH	3,23
	Acidità totale (g/l)	6,05
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

(*) Si è ritenuto opportuno rilevare la botrite a Rauscedo e l'oidio a Pescara, in considerazione delle diverse condizioni ambientali favorevoli all'una o all'altra malattia: percentuale di acini colpiti su venti grappoli esaminati per pianta.

Città S. Angelo

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaatura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Settembre

***SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)***

Botrite	-
Oidio (*)	3,88

***CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE***

Fertilità reale	1,71
Produzione per ceppo (Kg)	11,78
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	230
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

***PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI***

MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,92
	pH	3,21
	Acidità totale (g/l)	6,08
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; profumo intenso di frutta matura, persistente; sapore fresco, morbido, di ottima struttura. Al gusto-olfatto sono risultati preminenti la finezza e l'armonia. Da consumarsi giovane; nell'uvaggio aggiunge profumi.