

NEBBIOLO N.

Documento aggiornato al: 27/02/2024, 08:17. CREA/SNCV ©2011-2024.



Cosultore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata
Viticultura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per
il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Carema (TO)

I-CVT 308
(Picotener)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Neive (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3500
Periodo di osservazione	1996-1998

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria moderata
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività da moderata a media

FASE EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	Precoce
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Tardiva

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	Media
Oidio	Elevata

IL GRAPPOLO


- ✎ Grappolo medio-piccolo, cilindrico, alato, mediamente compatto
- ✎ Acino medio, ellissoidale corto, pruinoso



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,20
Produzione per ceppo (Kg)	2,80
Numero grappoli/ceppo	12
Peso medio grappolo (g)	250
Peso medio acino (g)	1,98
Peso legno potatura (g/ceppo)	930
Indice di Ravaz	3,01

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	22,9
	pH	3,00
	Acidità totale (g/l)	9,06
	Ac. Tartarico (g/l)	4,70
VINO	Ac. Malico (g/l)	2,88
	Antociani totali (mg/l)	110
	Polifenoli totali (mg/l)	1.970

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore rosso rubino tendente al granato; bouquet intenso con profumi floreali (rosa), fruttati, (piccoli frutti) e speziati (pepe, noce moscata e vaniglia); elevata alcolicità (13.4 %), acidità equilibrata, gusto pieno, rotondo e persistente. Idoneo al lungo invecchiamento.