

NEGROAMARO N.

Documento aggiornato al: 04/02/2026, 05:57. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

Torricella (TA)

I-UNIMI-VITIS-
NEG VV 606

CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	Sava (TA)
Periodo di osservazione	2002-2004

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso inferiore
- ✓ Fertilità inferiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Medio
Fioritura	Precoce
Invaiatura	Media
Maturazione	Media



IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, conico; semplice, serrato, con peduncolo visibile
- Acino medio tendente al grosso, obovoide; buccia pruinosa, violacea, spessa e consistente

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

CLONE


Fertilità reale	1,36
Produzione per ceppo (Kg)	3,11
Numero grappoli/ceppo	16,9
Peso medio grappolo (g)	212
Peso medio acino (g)	1,7

PARAMETRI ENOCHIMICI

CLONE

MOSTO	Zuccheri (° Brix)	22,4
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/Kg)	477
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2620

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino più colorato rispetto alla media della popolazione; risulta di ottimo equilibrio in bocca, dotato di buona tannicità e struttura. Al naso l'intensità olfattiva è sempre elevata e prevalgono insieme al caramello, le note fiorali. La persistenza gusto-olfattiva è lunga. Il clone è stato individuato per la produzione di vini di medio-lungo invecchiamento.