

NEGROAMARO N.

Documento aggiornato al: 27/07/2024, 17:15. CREA/SNCV ©2011-2024.



Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

Maruggio (TA)

I-UNIMI-VITIS-
NEG VV 688

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Sava (TA)
Periodo di osservazione	2002-2004

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso inferiore

✓ Fertilità inferiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Medio
Fioritura	Precoce
Invaiaatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO


- ✚ Grappolo medio, conico; semplice, serrato, con peduncolo visibile
- ✚ Acino medio tendente al grosso, obovoide; buccia pruinosa, violacea, spessa e consistente



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,47
Produzione per ceppo (Kg)	2,28
Numero grappoli/ceppo	12,89
Peso medio grappolo (g)	187
Peso medio acino (g)	1,7

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	21,8
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/Kg)	391
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2240

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino caratterizzato da un buon equilibrio, non particolarmente strutturato ma fine ed elegante a cui si accompagna un buon contenuto acido. Buona l'intensità olfattiva e la complessità aromatica in cui si distinguono sentori di frutta secca arricchiti da sentori floreali e leggere note di caramello. Il clone è stato individuato per l'ottenimento di vini di pronta beva e per rosati.