

NEGROAMARO N.

Documento aggiornato al: 04/02/2026, 05:58. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

Maruggio (TA)

I-UNIMI-VITIS-
NEG VV 688

CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	Sava (TA)
Periodo di osservazione	2002-2004


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso inferiore
- ✓ Fertilità inferiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Medio
Fioritura	Precoce
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, conico; semplice, serrato, con peduncolo visibile
- Acino medio tendente al grosso, obovoide; buccia pruinosa, violacea, spessa e consistente



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

CLONE


Fertilità reale	1,47
Produzione per ceppo (Kg)	2,28
Numero grappoli/ceppo	12,89
Peso medio grappolo (g)	187
Peso medio acino (g)	1,7

PARAMETRI ENOCHIMICI

CLONE

MOSTO	Zuccheri (° Brix)	21,8
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/Kg)	391
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2240

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino caratterizzato da un buon equilibrio, non particolarmente strutturato ma fine ed elegante a cui si accompagna un buon contenuto acidico. Buona l'intensità olfattiva e la complessità aromatiche in cui si distinguono sentori di frutta secca arricchiti da sentori floreali e leggere note di caramello. Il clone è stato individuato per l'ottenimento di vini di pronta beva e per rosati.