

PICOLIT B.

Documento aggiornato al: 27/07/2024, 17:19. CREA/SNCV ©2011-2024.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Cividale del Friuli (UD)

CONEGLIANO 1

I-SV

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ubicazione | Susegana (TV); Spresiano (TV) |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 1700 |
| Periodo di osservazione | 1980-1987 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** con colatura contenuta
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività discreta
- ✓ Buone gradazioni zuccherine ed acide dell'uva

FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|----------------|------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiatura | II decade Agosto |
| Maturazione | I decade Ottobre |

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, piramidale, spargolo
- ✚ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|---------|---|
| Botrite | - |
| Oidio | - |

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

| | |
|----------------------------------|-------|
| Fertilità potenziale delle gemme | 1,41 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 3,55 |
| Numero grappoli/ceppo | 42 |
| Peso medio grappolo (g) | 84,50 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

| | | |
|--------------|----------------------|-------|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | 19,75 |
| | pH | 3,12 |
| | Acidità totale (g/l) | 7,50 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; profumo delicato; sapore persistente, di buona alcolicità, armonico.