

PICOLIT B.

Documento aggiornato al: 11/12/2023, 12:43. CREA/SNCV ©2011-2023.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Località Togliano, Torreano (UD)

I-ISV-F 4

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN); Buttrio (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1983-1987

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio leggermente superiore e con minore colatura
- ✓ Fertilità delle gemme buona, inclusa quella basale
- ✓ Produttività superiore


FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, piramidale, alato
- ✚ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità potenziale delle gemme	1,11
Produzione per ceppo (Kg)	3,20
Numero grappoli/ceppo	27,3
Peso medio grappolo (g)	117
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	21,85
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	6,8
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino scarico; profumo delicato; ampio, persistente, che ricorda i fiori spontanei dei prati; sapore dolce, in equilibrio con i profumi e con la struttura.