

PICOLIT B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:30. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosuttitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Località Tigliano, Torreano (UD)

I-SV-F 6

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN); Buttrio (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1983-1987

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso medio leggermente superiore e con minore colatura
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività superiore

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio, piramidale, alato
- ❖ Acino medio, rotondeggiante

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE**PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,09
Produzione per ceppo (Kg)	3,0
Numero grappoli/ceppo	27,3
Peso medio grappolo (g)	110
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE**ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	21,40
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	6,6
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; profumo delicato e complesso che ricorda il favo d'api, abbastanza tipico. Sapore altrettanto armonioso con tantissime sfumature fiorali. Bilanciato di acidità, zuccheri ed alcool.