Documento aggiornato al: 04/11/2025, 02:48. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Località Togliano, Torreano (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Spilimbergo (PN); Buttrio (UD)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha) 2100

Periodo di osservazione 1983-1987


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio leggermente superiore e con minore colatura
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Marga Grappolo medio, piramidale, alato
- Acino medio, rotondeggiante





SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,09
Produzione per ceppo (Kg)	3,0
Numero grappoli/ceppo	27,3
Peso medio grappolo (g)	110
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	21,40
9	рН	3,20
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,6
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; profumo delicato e complesso che ricorda il favo d'api, abbastanza tipico. Sapore altrettanto armonioso con tantissime sfumature fiorali. Bilanciato di acidità, zuccheri ed alcool.