PINOT BIANCO B.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 17:21. CREA/SNCV ©2011-2026.

I-CRAVIT-ERSA FVG 140



Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 146 del 26/06/2009


Origine
Spessa di Cividale (UD)

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	ERSAGRICOLA Az. "Pantianicco" (UD)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico
Densità di impianto (ceppi/ha)	2750
Periodo di osservazione	2005-2007

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

- ✓ **Grappolo** decisamente più spargolo (*) ; leggera acinellatura
- ✓ **Acino** di dimensioni leggermente inferiori
- ✓ Fertilità reale leggermente inferiore
- ✓ Potenzialità produttiva medio-bassa
- ✓ Ottima tolleranza ai marciumi del grappolo



Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	I decade Settembre

Il Grappolo


- Grappolo medio, cilindrico, spesso con piccola ala, tendenzialmente semispargolo
- Acino rotondo

(*) Rispetto allo standard di riferimento

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,61
Produzione per ceppo (Kg)	3,41
Numero grappoli/ceppo	24,7
Peso medio grappolo (g)	138
Peso medio acino (g)	1,44
Peso legno potatura (g/ceppo)	920
Indice di Ravaz	3,70

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	22,34
	pH	3,36
	Acidità totale (g/l)	5,8
	Ac. Tartarico (g/l)	6,24
	Ac. Malico (g/l)	1,83

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dotato di notevole complessità ed intensità aromatica, caratterizzata da note predominanti di floreale e frutta gialla, completati da sensazioni ben distinte di minerale. In misura minore si evidenziano gli aromi di vaniglia e di vegetale. In bocca presenta un'ottima struttura accompagnata da un'interessante acidità. Il retrogusto è molto lungo e persistente.
Per le sue caratteristiche può essere considerato un biotipo migliorativo.