PINOT GRIGIO G.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 17:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Institut Agricole Regional

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 210 del 09/09/2005

Origine
Valle d'Aosta

I-IAR 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Moncenis (AO)	La Rochère (AO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot semplice	
Densità di impianto (ceppi/ha)	10.200	
Periodo di osservazione	1988-1991	1990-1993

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Il clone mostra la costante particolarità di manifestare mutazioni gemmarie, per cui alcuni **acini** presentano pellicola totalmente o parzialmente decolorata
- ✓ Vigoroso
- ✓ Elevato accumulo di zuccheri nelle bacche
- ✓ Contenuto in acido malico marcatamente correlato all'altitudine ed all'esposizione

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE	*CLONE*
Botrite	Media
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo
- Acino

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)	CLONE (**)
Fertilità reale	-	-
Produzione per ceppo (Kg)	1,83	2,18
Numero grappoli/ceppo	14,8	17,9
Peso medio grappolo (g)	124,7	119,8
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	670	860
Indice di Ravaz	2,73	2,53

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (*)	CLONE (**)
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	24,29	23,98
	pH	3,20	3,34
	Acidità totale (g/l)	8,99	6,57
	Ac. Tartarico (g/l)	6,65	6,20
	Ac. Malico (g/l)	4,81	2,83

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di elevata alcolicità, equilibrato e con marcata intensità di aromi. La ricca struttura, inoltre, ne garantisce la predisposizione ad un leggero invecchiamento e favorisce l'insorgere di particolari complessità aromatiche, che ne caratterizzano l'originalità.

(*) Località Moncenis: il campo è situato ad un'altitudine di 750 m. s.l.m., su di un terreno ad esposizione sud-est, a pendenza media, di origine e composizione varia.
(**) Località La Rochère: il campo è situato ai piedi della collina di Aosta, ad un'altitudine di 600 m. s.l.m., su di un terreno con esposizione sud, a leggera pendenza, di prevalente origine morenica, ricco di scheletro.