

PINOT NERO N.

Documento aggiornato al: 19/01/2026, 09:07. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Institut Agricole Regional

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 210 del 09/09/2005

Origine

Valle d'Aosta

I-IAR 1B

CAMPO DI OMOLGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Moncenis (AO)	La Rochère (AO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot semplice	
Densità di impianto (ceppi/ha)	10.200	
Periodo di osservazione	1988-1991	1990-1993

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di dimensioni ridotte e molto serrato
- ✓ Vigoria media
- ✓ Ottimo accumulo zuccherino nelle bacche
- ✓ Discreta resistenza alla muffa grigia

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo
- ▣ Acino

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)	CLONE (**)
Fertilità reale	-	-
Produzione per ceppo (Kg)	1,66	2,13
Numero grappoli/ceppo	12,3	15,8
Peso medio grappolo (g)	134,3	133,6
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	630	650
Indice di Ravaz	2,63	3,27

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (*)	CLONE (**)
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	23,77	22,39
	pH	3,32	3,34
	Acidità totale (g/l)	7,97	7,05
	Ac. Tartarico (g/l)	5,18	5,58
	Ac. Malico (g/l)	5,28	3,81
VINO	Antociani totali (mg/l)	-	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

(*) Località Moncenis: il campo è situato ad un'altitudine di 750 m. s.l.m., su di un terreno ad esposizione sud-est, a pendenza media, di origine e composizione varia.

(**) Località La Rochère: il campo è situato ai piedi della collina di Aosta, ad un'altitudine di 600 m. s.l.m., su di un terreno con esposizione sud, a leggera pendenza, di prevalente origine morenica, ricco di scheletro.