

# PRIMITIVO N.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



## Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 61 del 14/03/2006

## Origine

Manduria (TA)

I-UNIMI-VITIS-  
PRI VV 501

## CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	Sava (TA)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a cordone speronato
Periodo di osservazione	2002-2004

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso inferiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Precoce
Fioritura	Precoce
Invaiatura	Precoce
Maturazione	Precoce




## IL GRAPPOLO

- Grappolo mediamente compatto; conico-cilindrico; semplice, alato o doppio; peduncolo visibile, corto, grosso, semilegnoso
- Acino sferoidale, di media grandezza, buccia pruinosa di medio spessore

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>		<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,31	
Produzione per ceppo (Kg)	1,58	
Numero grappoli/ceppo	10,2	
Peso medio grappolo (g)	168	
Peso medio acino (g)	1,7	

<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>		<b>CLONE</b>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (° Brix)	23,9
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/Kg)	638
	Polifenoli totali (mg/Kg)	2642

### ***ANALISI SENSORIALE***



### ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

Vino molto colorato superiore alla media della popolazione, rosso rubino carico. Vino equilibrato e di particolare struttura. Delicati sentori di frutti di bosco. Il vino può essere impiegato nella produzione di vini di lungo invecchiamento.