PRIMITIVO N.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:14. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Fragagnano (TA)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Trinitapoli (FG)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 4000

Periodo di osservazione 2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità media o più
- ✓ Produzione elevata

FASE FENOLOGICA	E POCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Maggio
Invaiatura	I decade Luglio
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo più che medio, cilindrico, piramidale, semicompatto, munito di corte ali, spesso con una più evidente
- Acino medio, a buccia consistente e uniformemente colorata






SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	1,50
Oidio	0.83

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,33
Produzione per ceppo (Kg)	3,44
Numero grappoli/ceppo	13,3
Peso medio grappolo (g)	258
Peso medio acino (g)	2,25
Peso legno potatura (g/ceppo)	660
Indice di Ravaz	5,21

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,80
9	рН	3,21
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,90
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	5,52
	Ac. Malico (g/l)	2,41
VINO	Antociani totali (mg/l)	477 (*)
AI	Polifenoli totali (mg/l)	2.637 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dalle uve di questo biotipo si ottengono vini di colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, di media acidità, corposi, speziati, di elevata gradazione alcolica e di buona struttura. Nel complesso aromatico risultano prevalenti il fruttato maturo, il floreale, i sentori di erbaceo, cacao e liquirizia. Adatto al medio e lungo invecchiamento o da taglio.

