

RABOSO VERONESE N.

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 19:11. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Caorle (VE)

I-ISV-VI

CAMPO DI OMOLGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Monastier (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1500
Periodo di osservazione	1982-1985

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso medio superiore

✓ Fertilità media

FASE	EPOCA
FENOLOGICA	
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Settembre
Maturazione	III decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo piramidale, compatto, alato
- ❖ Acino piuttosto grande, rotondeggiante



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	0,98
Produzione per ceppo (Kg)	8,66
Numero grappoli/ceppo	28,6
Peso medio grappolo (g)	302,5
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	17,41
	pH	2,82
	Acidità totale (g/l)	14,4
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino; aroma vinoso caratteristico; di sapore mediamente alcolico, di buon corpo, vivace. Si presta all'invecchiamento.