

REFOSCO NOSTRANO N.

Documento aggiornato al: 29/01/2026, 10:37. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 253 del 30/10/2007

Origine

Area DOC Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia

I-VCR 470

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2002-2004

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione buona
- ✓ Nel mosto ottimo il contenuto di zuccheri e buono il contenuto di antociani

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre



IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio, cilindrico, munito di corte ali e spesso con un'ala evidente, da semicompatto a semispargolo
- ❖ Acino medio, a buccia consistente e intensamente colorata

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE *CLONE*

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Odio	-


CARATTERISTICHE *CLONE* PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,60
Produzione per ceppo (Kg)	4,43
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	277
Peso medio acino (g)	2,06
Peso legno potatura (g/ceppo)	800
Indice di Ravaz	5,53

PARAMETRI *CLONE* ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,93
	pH	3,53
	Acidità totale (g/l)	7,53
	Ac. Tartarico (g/l)	3,54
	Ac. Malico (g/l)	2,70
VINO	Antociani totali (mg/l)	555 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.185 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Alla degustazione spicca per tipicità, per le note speziate, di frutta matura, frutti rossi e floreale (viola).

(*) Dati medi relativi al biennio 2002-2003