# RONDINELLA N.

Documento aggiornato al: 30/10/2025, 08:07. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 165 del 16/07/2002

### **Origine**

Negrar (VR)

#### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); S. Ambrogio (VR)
Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha) 3333
Periodo di osservazione 1999-2001

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- √ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione inferiore
- ✓ Resistenza alla botrite ottima

FASE FENOLOGICA	ЕРОСА
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo
- Acino piccolo, con buccia intensamente e fortemente colorata




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLON	
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	2
Oidio	_

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,50
Produzione per ceppo (Kg)	3,46
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	229
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,4
9	рН	2,96
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,00
M	Ac. Tartarico (g/l)	4,36
	Ac. Malico (g/l)	1,56
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

# ANALISI SENSORIALE



# **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Al gusto-olfatto sono risultati preminenti i caratteri di corpo, finezza e intensità. Indicato per vini con ottima struttura e colore, fruttati. Ideale il taglio con il VCR 38.

<sup>(\*)</sup> Dati medi relativi al biennio 1999-2000

