

RONDINELLA N.

Documento aggiornato al: 23/02/2026, 04:14. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 165 del 16/07/2002

Origine

Negrar (VR)

I-VCR 32

CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); S. Ambrogio (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione inferiore
- ✓ Resistenza alla botrite ottima

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo piccolo
- ▣ Acino piccolo, con buccia intensamente e fortemente colorata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	2
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE


Fertilità reale	1,50
Produzione per ceppo (Kg)	3,46
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	229
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE (*)

ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,4
	pH	2,96
	Acidità totale (g/l)	6,00
	Ac. Tartarico (g/l)	4,36
	Ac. Malico (g/l)	1,56
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Al gusto-olfatto sono risultati preminenti i caratteri di corpo, finezza e intensità. Indicato per vini con ottima struttura e colore, fruttati. Ideale il taglio con il VCR 38.

(*) Dati medi relativi al biennio 1999-2000