

ROSSIGNOLA N.

Documento aggiornato al: 06/05/2025, 03:31. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Affi (VR)

I-ISV-CV 7

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Giorgio in Salici (VR); S. Pietro in Cariano (VR)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1976-1978

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoroso
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività elevata

FASE

EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	III decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo cilindrico, alato, tendenzialmente spargolo
- ✿ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	17,8
Oidio	-

**CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE**

Fertilità reale	0,93
Produzione per ceppo (Kg)	13,93
Numero grappoli/ceppo	67
Peso medio grappolo (g)	207,4
Peso medio acino (g)	2,05
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	16,55
	pH	3,00
	Acidità totale (g/l)	11,3
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; profumo delicato; abbastanza corposo, acidità piuttosto sostenuta, armonico.

Adatto per la preparazione di “base spumante”.