ROSSIGNOLA N.

Documento aggiornato al: 15/11/2026, 00:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);
Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine
Affi (VR)

I-ISV-CV 9

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Giorgio in Salici (VR); S. Pietro in Cariano (VR)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1976-1978

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** più spargolo
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività contenuta
- ✓ Minore sensibilità alla botrite



FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-grande, cilindrico, alato, tendenzialmente spargolo
- Acino medio, rotondeggiante

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	0,92
Produzione per ceppo (Kg)	11,7
Numero grappoli/ceppo	59
Peso medio grappolo (g)	198,1
Peso medio acino (g)	2,11
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	16,51
	pH	3,11
	Acidità totale (g/l)	10,7
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; profumo delicato; acidità piuttosto sostenuta, liscio, gradevole.