

SANGIOVESE N.

Documento aggiornato al: 19/05/2022, 17:33. CREA/SNCV ©2011-2022.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 258 del 04/11/1996

Origine

Montalcino (SI)

I-VCR 103

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); San Benedetto del Tronto (AP)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	2700
Periodo di osservazione	1992-1994

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione buona
- ✓ Resistenza alla botrite buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, semicompatto, alato
- ✚ Acino meno che medio, subrotondo, di colore bleu-nero uniformemente distribuito



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite (**)	3,55
Oidio (***)	3,77

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE


Fertilità reale	1,47
Produzione per ceppo (Kg)	7,70
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	261
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE (*)

ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,8
	pH	3,16
	Acidità totale (g/l)	7,6
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone è indicato per vini di prolungato invecchiamento, speziati, ricchi di colore. Il profilo aromatico è caratterizzato da sentori di viola e di frutti rossi.

(*) Dati medi relativi al triennio 1991-1993; Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (**) e San Benedetto del Tronto (AP) (***)