SANGIOVESE N.

Documento aggiornato al: 29/11/2025, 07:34. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 258 del 04/11/1996

Origine

Montalcino (SI)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); San Benedetto del Tronto (AP)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Sylvoz

Densità di impianto (ceppi/ha) 2700

Periodo di osservazione 1992-1994

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità ottima
- ✓ Produzione buona
- ✓ Resistenza alla botrite buona

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, semicompatto, alato
- Acino meno che medio, subrotondo, di colore bleu-nero uniformemente distribuito




Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE	
Botrite (**)	3,55
Oidio (***)	3,77

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,47
Produzione per ceppo (Kg)	7,70
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	261
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	$CLONE^{(*)}$
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,8
2	рН	3,16
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,6
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
M	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone è indicato per vini di prolungato invecchiamento, speziati, ricchi di colore. Il profilo aromatico è caratterizzato da sentori di viola e di frutti rossi.

^(*) Dati medi relativi al triennio 1991-1993; Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (***) e San Benedetto del Tronto (AP) (****)



