SANGIOVESE N.

Documento aggiornato al: 29/11/2025, 07:34. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Scansano (GR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN), Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha) Periodo di osservazione 1997-1999

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Morellino"
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità costante
- ✓ Produzione media
- ✓ Buona resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, semicompatto
- Acino piccolo, buccia consistente con colorazione intensa ed uniformemente distribuita




Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE (%)	
Botrite	1,5
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,68
Produzione per ceppo (Kg)	4,43
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	264
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	19,65
<u>o</u>	рН	3,26
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,27
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VII	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone è adatto per la produzione di vini di ottima struttura, dotati di tannini dolci, rotondi. Interessante il taglio con il VCR 106. Molto accentuate le componenti speziato-fenolico e fruttato.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999

