

IN ATTESA DI ULTERIORI DATI NON ANCORA TRASMESSI DAL COSTITUTORE!



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016





Costitutore

Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 186 del 09/08/2013

Origine

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

- 1

Forma di allevamento

.

Densità di impianto (ceppi/ha)

-

Periodo di osservazione

| -

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria media

✓ Produttività media


FASE FENOLOGICA	EPOCA	
Germogliamento	II-III decade Aprile	
Fioritura	I-II decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	III decade Settembre -	
	I decade Ottobre	

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, largo, di forma cilindrica, alato, mediamente spargolo
- Acino medio, largo, ellissoidale stretto; buccia di colore blu-nero uniforme, pruinosa





CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	-
2	pН	-
MOSTO	Acidità totale (g/l)	-
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
AIN	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino, con buona intensità e finezza olfattiva. Possiede buona intensità gusto-olfattiva, corpo ed armonia, la persistenza è elevata. Idoneo all'invecchiamento.

