Documento aggiornato al: 15/12/2025, 12:37. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura; ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

S. Quirino (PN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	ERSAGRICOLA Az. "Pantianicco" (UD)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot doppio
Densità di impianto (ceppi/ha)	2750
Periodo di osservazione	2005-2007

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo più spargolo
- ✓ **Acino** di peso superiore (*)
- ✓ Fertilità superiore (*)
- ✓ Potenzialità produttiva media-mediobassa

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, tronco-piramidale, spargolo, alato
- Acino medio, sub-ovoidale



^(*) Rispetto al clone di riferimento I-ISV-F 5






CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,71
Produzione per ceppo (Kg)	4,1
Numero grappoli/ceppo	27,8
Peso medio grappolo (g)	156
Peso medio acino (g)	1,95
Peso legno potatura (g/ceppo)	940
Indice di Ravaz	4,36

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	21,97
9	рН	3,17
MOSTO	Acidità totale (g/l)	9,3
M	Ac. Tartarico (g/l)	7,72
	Ac. Malico (g/l)	3,13

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo dorato molto carico, note molto importanti di erbe aromatiche e di fiori, percettibili, inoltre, le sensazioni di frutta matura. Ottima la persistenza e la struttura accompagnate da un lungo finale; porta come sua caratteristica principale una ottima tipicità e piacevolezza.

Può essere consigliato come biotipo di base.

