

SYRAH N.

Documento aggiornato al: 25/05/2026, 00:10. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Nanto (VI)

I-VCR 261

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Bastia Umbra (PG)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2008-2010

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria ottima
- ✓ Fertilità leggermente superiore
- ✓ Produzione ottima e costante

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, cilindrico-piramidale, leggermente allungato, semispargolo, con un'ala ricorrente, quasi a formare un secondo grappolo
- ✿ Acino medio-grosso, ovoidale; buccia consistente e pruinosa, di colore nero-blu uniformemente pigmentata



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,67
Oidio	0,67


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,70
Produzione per ceppo (Kg)	3,75
Numero grappoli/ceppo	18,7
Peso medio grappolo (g)	201
Peso medio acino (g)	1,92
Peso legno potatura (g/ceppo)	800
Indice di Ravaz	4,69

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,40
	pH	3,38
	Acidità totale (g/l)	5,83
	Ac. Tartarico (g/l)	5,18
	Ac. Malico (g/l)	2,93
VINO	Antociani totali (mg/l)	620 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	1.805 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2008-2009

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di buona intensità e tonalità colorante, dai sentori fruttato-floreali, con note di violetta, leggermente speziato. Al palato è secco, di corpo, discretamente tannico, alcolico.

Si presta all'affinamento in barriques e all'uvaggio con numerosi vitigni tra i quali Cabernet sauvignon, Nero d'Avola e Sangiovese.