

TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 09/05/2026, 15:20. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosuitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Azzano X (PN)

I-ISV-F 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN); Buttrio (UD); Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1800
Periodo di osservazione	1983-1987

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona
- ✓ Buona gradazione zuccherina delle uve ed acidità superiore

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, piramidale, talvolta alato, semicompatto, piuttosto leggero
- ✿ Acino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità potenziale delle gemme	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	8,1
Numero grappoli/ceppo	59,5
Peso medio grappolo (g)	136
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	19,40
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	6,9
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino; profumo fine, delicato, caratteristico, con sapore di mandorla amara; di corpo, tipico ed equilibrato.

Clone interessante per la produzione di vini da invecchiamento, in quanto si evolve in maniera positiva nel tempo acquisendo sensazioni nobili e complesse.