TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 15/12/2025, 12:38. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 199 del 27/08/1990

Origine

Azzano X (PN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Spilimbergo (PN); Buttrio (UD): Codroipo (UD)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha) | 1800

Periodo di osservazione 1983-1987


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività buona
- ✓ Buona gradazione zuccherina delle uve ed acidità superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, piramidale, talvolta alato, semicompatto, piuttosto leggero
- Acino medio, rotondeggiante





SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	8,1
Numero grappoli/ceppo	59,5
Peso medio grappolo (g)	136
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	_

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	19,40
2	рН	3,15
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,9
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino; profumo fine, delicato, caratteristico, con sapore di mandorla amara; di corpo, tipico ed equilibrato.

Clone interessante per la produzione di vini da invecchiamento, in quanto si evolve in maniera positiva nel tempo acquisendo sensazioni nobili e complesse.

